



- 01** 입안 상처는 2~3주 후에 아물게 됩니다. 이 기간에는 상처가 벌어지지 않도록 주의하여야 합니다. 이 기간에는 부드러운 음식을 드시고, 칫솔질을 하지 않는 것이 안전하며, 가글할 때도 입을 풍선처럼 부풀리지 않는 것이 좋습니다. 상처가 벌어지게 되면 다시 봉합하여야 합니다.
- 02** 염증을 예방하기 위하여 5일간 항생제를 복용합니다. 또한 음식 섭취 후 구강을 청결하게 유지하는 것이 중요합니다.
- 03** 수술 후 24~48시간 내에는 출혈이 발생할 수 있습니다. 사각턱, 양악수술, 편악수술, 돌출입수술 등이 이에 해당되며, 수술 당일은 압박 붕대를 감은 상태로 입원합니다. 수술 다음날에도 출혈이 의심되면 퇴원할 수 없습니다. 24시간 경과 후에 출혈이 의심되지 않으면 퇴원하게 되는데, 귀가 후에도 1~2일은 안정하셔야 하며 보호자의 관찰이 필요합니다. 갑자기 얼굴이 부어오르면서 통증이 심해지면 곧바로 병원에 연락하셔야 합니다.
- 04** 수술 후 얼굴 피부의 감각의 변화가 있을 수 있습니다. 대개는 수개월 경과하면 정상으로 돌아오지만 드물게 계속 지속될 수 있습니다. 수술 후 초기에 치아가 당기는 느낌, 입이 뻑뻑한 느낌 등 다양한 느낌을 경험할 수도 있지만 대부분 문제 없이 없어지게 됩니다.
- 05** 광대 축소 수술로 절골된 광대뼈에 유합이 이루어지려면 2~3개월이 필요합니다. 이 기간 동안에 광대 부위에 충격이나 압박이 가해지지 않도록 주의하여야 합니다. 또한 입을 크게 벌리는 것, 단단한 음식을 씹는 것, 입을 심하게 악무는 것도 삼가하셔야 합니다.
- 06** 얼굴 양쪽은 완전 대칭일 수 없습니다. 머리 부위 부터 양쪽이 약간씩 다르며, 수술 후에도 완전 대칭은 이룰 수 없습니다.
- 07** 퇴원 후 발생하는 궁금하신 사항이나 혹은 긴급상황이 발생할 경우 병원(TEL 1588-5153)으로 직접 전화 주시기 바랍니다.